

Tabagismo durante período gestacional e peso ao nascer dos neonatos

Ester Zoche¹, Juliane Alves Santos¹, Karen Yurika Kudo¹, Clarissa de Oliveira Agostini², Eunice Beatriz Martin Chaves¹, Helena Von Eye Corleta², Vera Lúcia Bosa²

Objetivo: Considerando a forte relação entre tabagismo materno e alterações no crescimento intrauterino e peso ao nascer da criança, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do tabagismo durante a gestação de mulheres residentes no município de Porto Alegre no peso ao nascer do neonato. **Material e Métodos:** O estudo transversal realizou-se na unidade de internação obstétrica de um hospital terciário de Porto Alegre com 48 puérperas e seus neonatos. Os dados foram coletados através de uma entrevista no puerpério imediato e das informações de peso e idade gestacional presentes na carteirinha da criança. Considerou-se baixo peso/peso insuficiente ao nascer crianças com 2.500 a 3.000 g e peso adequado, acima de 3.000 g. **Resultados:** A média de idade materna foi $26 \pm 5,29$ anos. Dos 48 recém-nascidos 8,3% apresentaram baixo peso/peso insuficiente ao nascer. Das puérperas avaliadas, 22% relataram ter fumado durante a gestação. Quando observado o baixo peso/peso insuficiente, o grupo das mães não fumantes apresentou 5% de baixo peso/peso insuficiente e o grupo das mães fumantes apresentou 18% da amostra com baixo peso/peso insuficiente. A média do peso das crianças não expostas ao tabagismo foi de $3.358 \text{ g} \pm 350 \text{ g}$ enquanto que em crianças expostas foi de $3.070 \text{ g} \pm 450 \text{ g}$. **Conclusão:** Não houve diferença significativamente estatística entre tabagismo gestacional e baixo peso/peso insuficiente, mas pôde-se observar alta prevalência de baixo peso/peso insuficiente e menor peso ao nascer nos neonatos expostos ao tabagismo. Desfechos deletérios tanto à mãe como ao bebê possivelmente podem ser evitados pelo não consumo do tabaco durante período gestacional.

1. Hospital de Clínicas de Porto Alegre/HCPA.

2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS.

Como citar: Zoche E, Santos JA, Kudo KY, Agostini CO, Chaves EB, Corleta HV, Bosa VL. Tabagismo durante período gestacional e peso ao nascer dos neonatos. Bol Cien Pediatr. 2016;05(2):57.

* Trabalho selecionado para apresentação oral no IX Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria, de 1° a 4 de junho de 2016, em Porto Alegre, RS.